

Élettani és kóros testváladékok
(hányadék)

Név, osztály: _____

- 1) Hogyan hívjuk a hányást latinul? Jelöljön meg két választ! (Több válasz jelölhető)/2 pont
 emesis obstipatio
 vomitus diarrhoe
 diureis
- 2) Hol található a hányás reflex-központja? (Egy válasz jelölhető)/1 pont
 kisagy agykéreg
 agytörzs gerincvelő
- 3) Milyen a hányadék vegyhatása, ha gyomorból ürül? (Egy válasz jelölhető)/1 pont
 lúgos savas
- 4) Mit jelent a sugárhányás? (Egy válasz jelölhető)/1 pont
 hányinger nem vezeti be a hányást hányinger után nagy mennyiségben üríti a hányadékát a beteg
- 5) Milyen a hányadék jellegzetessége vékonybél ileus esetén? (Egy válasz jelölhető)/1 pont
 zöldes, sárgás székletszagú, sötétbarna színű
 víztiszta, habos
- 6) Milyen a hányadék jellegzetessége epebetegség esetén? (Egy válasz jelölhető)/1 pont
 víztiszta, habos székletszagú, barna színű
 sárgás-zöldes
- 7) Honnan ürülhet a kávéaljszerű hányadék? (Egy válasz jelölhető)/1 pont
 gyomorból vastagbélből
- 8) Válassza ki az Ön által helyesnek ítélt választ! (Egy válasz jelölhető)/1 pont
 A hányást a gégefedő megnyílása teszi lehetővé. A hányást az emésztőrendszer antiperisztaltikus mozgása teszi lehetővé.
 A hányást az emésztőrendszer perisztaltikus mozgása teszi lehetővé.
- 9) Válassza ki az Ön által helyesnek ítélt választ! (Egy válasz jelölhető)/1 pont
 Hányás során az egyén nagy mennyiségű folyadékot veszíthet, legyengülhet, emiatt leginkább energiaitalt kell vele itatni A hányás során az egyén nagy mennyiségű folyadékot veszíthet, emiatt a folyadék- és elektrolitháztartásra fokozottan figyelni kell, ha szükséges infúziós oldattal szükséges pótolni.
 Hányás során az egyén nagy mennyiségű folyadékot veszíthet, de a homeosztázis miatt nem kell visszapótolni az elvesztett folyadékot, mert a szervezet szabályozza a folyadékhiányt.
- 10) Döntse el, hogy igazak vagy hamisak-e az alábbi állítások!/4 pont
- Sugárhányás központi idegrendszeri betegségek esetén jelentkeznek. Igaz Hamis
- Abban az esetben, ha fekvőbeteg hány, a fejét oldalra kell fordítani, az aspiratio kivédése céljából. Igaz Hamis
- A kávéaljszerű hányadék reggeli órákban jelentkezik, ha a gyomorfekélyes beteg kávét iszik. Igaz Hamis
- A kávéaljszerű hányadék emésztetlen vért tartalmaz. Igaz Hamis



Ez a feladatlap a Redmentával készült.

Értékelés:/14 pont

jeles 12 - 14 pont
jó 10 - 11 pont
közepes 9 - 9 pont
elégéses 8 - 8 pont
elégtelen 0 - 7 pont

Élettani és kóros testváladékok
(hányadék)

Név, osztály: _____

1) Hogyan hívjuk a hányást latinul? Jelöljön meg két választ! (Több válasz jelölhető) _____/2 pont

- emesis obstipatio
 vomitus diarrhoe
 diureis

2) Hol található a hányás reflex-központja? (Egy válasz jelölhető) _____/1 pont

- kisagy agykéreg
 agytörzs gerincvelő

3) Milyen a hányadék vegyhatása, ha gyomorból ürül? (Egy válasz jelölhető) _____/1 pont

- lúgos savas

4) Mit jelent a sugárhányás? (Egy válasz jelölhető) _____/1 pont

- hányinger nem vezet be a hányást hányinger után nagy mennyiségben üríti a hányadékát a beteg

5) Milyen a hányadék jellegzetessége vékonybél ileus esetén? (Egy válasz jelölhető) _____/1 pont

- zölde, sárgás székletszagú, sötétbarna színű
 víztiszta, habos

6) Milyen a hányadék jellegzetessége epebetegség esetén? (Egy válasz jelölhető) _____/1 pont

- víztiszta, habos székletszagú, barna színű
 sárgás-zölde

7) Honnan ürülhet a kávéaljszerű hányadék? (Egy válasz jelölhető) _____/1 pont

- gyomorból vastagbélből

8) Válassza ki az Ön által helyesnek ítélt választ! (Egy válasz jelölhető) _____/1 pont

- A hányást a gégefedő megnyílása teszi lehetővé. A hányást az emésztőrendszer antiperisztaltikus mozgása teszi lehetővé.
 A hányást az emésztőrendszer perisztaltikus mozgása teszi lehetővé.

9) Válassza ki az Ön által helyesnek ítélt választ! (Egy válasz jelölhető) _____/1 pont

- Hányás során az egyén nagy mennyiségű folyadékot veszíthet, legyengülhet, emiatt leginkább energiatöltet kell vele itatni
 A hányás során az egyén nagy mennyiségű folyadékot veszíthet, emiatt a folyadék- és elektrolitháztartásra fokozottan figyelni kell, ha szükséges infúziós oldattal szükséges pótolni.

- Hányás során az egyén nagy mennyiségű folyadékot veszíthet, de a homeosztázis miatt nem kell visszapótolni az elveszített folyadékot, mert a szervezet szabályozza a folyadékhiányt.

10) Döntse el, hogy igazak vagy hamisak-e az alábbi állítások! _____/4 pont

- Sugárhányás központi idegrendszeri betegségek esetén jelentkeznek. Igaz Hamis
Abban az esetben, ha fekvőbeteg hány, a fejét oldalra kell fordítani, az aspiratio kivédése céljából. Igaz Hamis
A kávéaljszerű hányadék reggeli órákban jelentkezik, ha a gyomorfekélyes beteg kávét iszik. Igaz Hamis
A kávéaljszerű hányadék emésztetlen vért tartalmaz. Igaz Hamis



Ez a feladatlap a Redmentával készült.

Értékelés: _____/14 pont

- jeles 12 - 14 pont
jó 10 - 11 pont
közepes 9 - 9 pont
elégséges 8 - 8 pont
elégtelen 0 - 7 pont

A feladatlapon szereplő feladatok az írásbeli számonkérés alkalmával ismétlődhetnek.
<http://www.redmenta.com> (kereséshez szükséges direkt cím: Hányadék)