

NÉV: Évfolyam:

1. * Ismertesse a széklet változásait a megadott szempontok szerint! Egészítse ki a táblázatot!

6 pont

Kóros állapotok	Széklet jellemzője
epeút elzáródás	
	emésztett vért tartalmazó szurokszéklet
	alvadékos vért tartalmazó széklet
végbél berepedése	
	rothadásos, bűzös széklet
vastagbél daganat	

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

2. * Határozza meg az elsődleges vizelet jellemzőit a megadott szempontok alapján!

6 pont

Mennyisége:

Fajsúlya:

Összetétele: Írjon négyet /4/!

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

3. Párosítsa a tüdőbetegségeket a rájuk jellemző köpettípusokkal! Írja a számok mellé a helyes válasz betűjelét!

4 pont

- | | |
|----------------------------------|----------------------|
| 1. gennyes köpet | A. tüdőtályog |
| 2. élénkpiros színű, véres köpet | B. asthma cardiale |
| 3. bőséges, szilvalászerű köpet | C. asthma bronchiale |
| 4. üvegszerű, tapadós köpet | D. tuberkulózis |

1.-.....,

2.-.....,

3.-.....,

4.-.....

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

4. * Húzza alá a felsoroltak közül azokat az alkotórészeket, amelyek a széklet élettanilag NEM tartalmaz!

4 pont

- | | |
|--------|-------------------------|
| vér | emésztetlen ételmaradék |
| víz | genny |
| nyák | bélnedv |
| férgek | |

(Csak a 4 helyes válasz együttes aláhúzása esetén adható pont!
Egyéb megoldások esetén pontszám nem adható!)

5. Húzza alá az Ön által igaznak ítélt állításokat!

2 pont

- A kávéaljszerű hányadék emésztetlen vért tartalmaz.
- Hányás esetén a fekvőbeteg fejét oldalra kell fordítani, az aspiratio kivédése céljából.
- A kávéaljszerű hányadék reggeli órákban jelentkezik, ha a gyomorfekélyes beteg kávéat iszik.
- Sugárhányás központi idegrendszeri betegségek esetén jelentkezik.

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

Értékelés: 0-25 pont = elégtelen (1), 26-30 pont = elégséges (2), 31-35 pont = közepes (3), 36-40 pont = jó (4), 41-50 pont = jeles (5)
A feladatlapon szereplő feladatok az írásbeli számonkérés alkalmával ismétlődhetnek.

6. Írja le az alábbi szakkifejezések jelentését! Egészítse ki a táblázat hiányzó részeit! 6 pont

latinul	magyarul
polyuria	
	vizelet-visszatartási képtelenség
retentio urinae	
	vizelési képtelenség/vizelet elválasztás szünetelése (a 24 óra alatt ürített vizelet mennyisége 200 ml alatt van);
ischuria paradoxa	
oliguria	

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

7. Rendelje a székletürítés zavaraihoz a zavart előidéző okokat! Írja a megfelelő csoporthoz az okok sorszámát! 4 pont

- | | |
|--------------------------|----------------------------------|
| 1. ülőmunka, mozgáshiány | 5. vastartalmú gyógyszerek |
| 2. felszívódási zavar | 6. hashajtók szedése |
| 3. folyadékhiány | 7. pajzsmirigy fokozott működése |
| 4. salmonella-fertőzés | 8. új környezet |

Obstipatio:,

Diarrhoe:

(Helyes válaszonként 0,5-0,5 pont adható!)

8. Írjon a kipontozott részre I (igaz) vagy H (hamis) betűt minden állítás elé, annak megfelelően, hogy igaz vagy hamis az állítás! 6 pont

- A köpet állaga a fibrin tartalomtól függ.
- A végleges vizelet élettani körülmények között fehérjét és cukrot is tartalmazhat.
- A hüvelyben élettani körülmények között jelen vannak a Döderlein-bacilusok.
- A vizeletürítése komplex reflexfolyamat, központja a gerincvelő alsó szakaszában található.
- A másodlagos sebgyógyulás latin megnevezése a sanatio per primam.
- A napi vizeletmennyiséget diuresisnek nevezzük.

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható.)

9. Párosítsa a jellegzetes hányadékokat a lehetséges okokkal! Írja a számok mellé a helyes válasz betűjelét! 4 pont

- | | |
|------------------------------------|-----------------|
| 1. víztiszta, habos | A. epebetegség |
| 2. kávéaljszerű | B. bélelzáródás |
| 3. zöldes-sárgás | C. gyomorvérzés |
| 4. sötétbarna színű, széklet szagú | D. várandóság |

1.-....., 2.-....., 3.-....., 4.-.....

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

10. Sorolja fel az elsődleges sebgyógyulás jellemzőit! Írjon 4-et! 4 pont

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható.)

11. Sorolja fel a sebváladákok megfigyelésének szempontjait! Írjon 4-et! 4 pont

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható.)

Értékelés: 0-25 pont = elégtelen (1), 26-30 pont = elégséges (2), 31-35 pont = közepes (3), 36-40 pont = jó (4), 41-50 pont = jeles (5)
A feladatlapon szereplő feladatok az írásbeli számonkérés alkalmával ismétlődhetnek.

NÉV: Évfolyam:

1. * Ismertesse a széklet változásait a megadott szempontok szerint! Egészítse ki a táblázatot!

6 pont

Kóros állapotok	Széklet jellemzője
epeút elzáródás	világos színű, acholiás széklet vagy agyagszínű
gyomorvérzés, emésztőrendszer felső és középső szakaszának vérzése	emésztett vért tartalmazó szurokszéklet
vastagbélgyulladás	alvadékos vért tartalmazó széklet
végbél berepedése	friss, piros vért tartalmazó széklet
fehérjeemésztési zavar	rothadós, bűzös széklet
vastagbél daganat	székrekedés/hasmenés váltakozása, majd ceruzaszéklet véres széklet

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

2. * Határozza meg az elsődleges vizelet jellemzőit a megadott szempontok alapján!

6 pont

Mennyisége: napi 180 l

Fajsúlya: 1010

Összetétele: Írjon négyet /4/!

- víz
- ásványi anyagok
- cukor
- aminosavak
- festékanyagok

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

3. Párosítsa a tüdőbetegségeket a rájuk jellemző köpettípusokkal! Írja a számok mellé a helyes válasz betűjelét!

4 pont

- | | |
|----------------------------------|----------------------|
| 1. gennyes köpet | A. tüdőtályog |
| 2. élénkpiros színű, véres köpet | B. asthma cardiale |
| 3. bőséges, szilvalászerű köpet | C. asthma bronchiale |
| 4. üvegszerű, tapadós köpet | D. tuberkulózis |

1.-.....**A**....., 2.-.....**D**....., 3.-.....**B**....., 4.-.....**C**.....

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

4. * Húzza alá a felsoroltak közül azokat az alkotórészeket, amelyek a széklet élettanilag NEM tartalmaz!

4 pont

- | | |
|--|---|
| <p><u>vér</u></p> <p>víz</p> <p><u>nyák</u></p> <p><u>férgek</u></p> | <p>emésztetlen ételmaradék</p> <p><u>genny</u></p> <p>bélnedv</p> |
|--|---|

(Csak a 4 helyes válasz együttes aláhúzása esetén adható pont!
 Egyéb megoldások esetén pontszám nem adható!)

5. Húzza alá az Ön által igaznak ítélt állításokat!

2 pont

- A kávéaljszerű hányadék emésztetlen vért tartalmaz.
- Hányás esetén a fekvőbeteg fejét oldalra kell fordítani, az aspiratio kivédése céljából.
- A kávéaljszerű hányadék reggeli órákban jelentkezik, ha a gyomorfekélyes beteg kávéat iszik.
- Sugárhányás központi idegrendszeri betegségek esetén jelentkezhet.

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

Értékelés: 0-25 pont = elégtelen (1), 26-30 pont = elégséges (2), 31-35 pont = közepes (3), 36-40 pont = jó (4), 41-50 pont = jeles (5)
 A feladatlapon szereplő feladatok az írásbeli számonkérés alkalmával ismétlődhetnek.

6. Írja le az alábbi szakkifejezések jelentését! Egészítse ki a táblázat hiányzó részeit! 6 pont

latinul	magyarul
polyuria	bővizelés (a 24 óra alatt ürített vizelet mennyisége 2000 ml vagy afelett van);
incontinentia urinae	vizelet-visszatartási képtelenség
retentio urinae	vizelet- visszamaradás
anuria	vizelési képtelenség/vizelet elválasztás szünetelése (a 24 óra alatt ürített vizelet mennyisége 200 ml alatt van);
ischuria paradoxa	vizeletcsepegés
oliguria	kevés vizeletürítés vagy a vizelet mennyiségének megkevesbedése (a 24 óra alatt ürített vizelet mennyisége 500 ml alatt van);

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

7. Rendelje a székletürítés zavaraihoz a zavart előidéző okokat! Írja a megfelelő csoporthoz az okok sorszámát! 4 pont

- | | |
|--------------------------|----------------------------------|
| 1. ülőmunka, mozgáshiány | 5. vastartalmú gyógyszerek |
| 2. felszívódási zavar | 6. hashajtók szedése |
| 3. folyadékhiány | 7. pajzsmirigy fokozott működése |
| 4. salmonella-fertőzés | 8. új környezet |

Obstipatio:**1,3,5,8**.....,

Diarrhoe:**2,4,6,7**.....

(Helyes válaszonként 0,5-0,5 pont adható!)

8. Írjon a kipontozott részre I (igaz) vagy H (hamis) betűt minden állítás elé, annak megfelelően, hogy igaz vagy hamis az állítás! 6 pont

- ...**I**..... A köpet állaga a fibrin tartalomtól függ.
- ...**H**... A végleges vizelet élettani körülmények között fehérjét és cukrot is tartalmazhat.
- ...**I**... A hüvelyben élettani körülmények között jelen vannak a Döderlein-bacilusok.
- ...**I**... A vizeletürítése komplex reflexfolyamat, központja a gerincvelő alsó szakaszában található.
- ...**H**... A másodlagos sebgyógyulás latin megnevezése a sanatio per primam.
- ...**I**... A napi vizeletmennyiséget diuresisnek nevezzük.

9. (Helyes válaszonként 1-1 pont adható.)

10. Párosítsa a jellegzetes hányadékokat a lehetséges okokkal! Írja a számok mellé a helyes válasz betűjelét! 4 pont

- | | |
|------------------------------------|-----------------|
| 1. víztiszta, habos | A. epebetegség |
| 2. kávéaljszerű | B. bélelzáródás |
| 3. zöldes-sárgás | C. gyomorvérzés |
| 4. sötétbarna színű, széklet szagú | D. várandótság |
- 1.-.....**D**....., 2.-.....**C**....., 3.-.....**A**....., 4.-.....**B**.....

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

11. Sorolja fel az elsődleges sebgyógyulás jellemzőit! Írjon 4-et! 4 pont

a sebet éles, steril eszköz okozza (pl. műtéti seb); a szövetroncsolás minimális; a sebszélék összefekszenek; a sebgyógyulás a sebszélék felől indul meg; a fertőzés kialakulásának esélye csekély;

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható.)

12. Sorolja fel a sebváladékok megfigyelésének szempontjait! Írjon 4-et! 4 pont

színe, szaga, állaga, mennyisége, jellege/tartalma

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható.)

Értékelés:

0-25 pont = elégtelen (1), 26-30 pont = elégséges (2), 31-35 pont = közepes (3), 36-40 pont = jó (4), 41-50 pont = jeles (5)